



## Wann müssen Personen in die Absonderung?



**Positiv getestet**  
(PCR-Test)



**Covid-19 krankheitsverdächtig**  
mit og. Symptomen und PCR-Anordnung  
bzw. ausstehendem PCR-Ergebnis



**Verdachtsperson**  
positiver Schnelltest



**Kontaktpersonen**

### Unverzüglich ...

1. **absondern** (nach Hause gehen) und persönliche Kontakte einstellen!
2. **Kontaktliste (Name, Adresse, Telefon) erstellen**, mit den Personen, zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein **enger Kontakt** bestand (einschließlich der Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben)
3. **Gesundheitsamt kontaktieren** - gilt noch nicht bei **Verdachtsperson** (erst bei positivem **PCR-Test**)
4. **Arbeitgeber** über Beginn der Absonderung **informieren** (möglich auch ohne Bescheinigung des Gesundheitsamtes) | bei Kindern und Jugendlichen **ggf. Schulleitung bzw. Kita-Einrichtung informieren**
5. **Kontaktpersonen** über die festgestellte bzw. mögliche Infektion **informieren**
6. **Verdachtsperson: PCR-Test veranlassen**  
(soweit vorher ein Schnell- oder Selbsttest positiv war)

**Dauer**  
der Absonderung



**5 Tage**

### Beendigung der Absonderung

- Nach positiven Test mit Symptomen:**
- frühestens 48 Stunden nach Symptomfreiheit, jedoch nicht vor Ablauf von 5 Tagen
- Nach positiven Test ohne Symptome:**
- Mit Ablauf von 5 Tagen nach dem Tag der Abstrichnahme des positiven PCR-Tests

Nach Beendigung der Absonderung wird dringend empfohlen täglich eine Selbsttestung durchzuführen und sich bis zu einem negativen Testergebnis freiwillig weiter selbst zu isolieren.

- **enger Kontakt** (weniger als 1,5 Meter Abstand) mehr als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz - oder -
- **Gespräch** (weniger als 1,5 Meter Abstand) ohne adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - oder -
- **mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum**

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt die jeweils erforderliche Maske

### Keine Absonderungspflicht, aber:

Es wird dringend empfohlen, Kontakte zu reduzieren, insbesondere mit älteren Menschen sowie Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf, und in den fünf auf den Kontakt folgenden Tagen täglich einen Antigen-Schnelltest durchzuführen.